İŞLEM ÖNCESİ
HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Sayın .....,

Size uygulanacak **çocuk alınması için kürtaj (rahim tahliyesi, gebelik sonlandırılması, bebek aldırma)** işlemi aşağıda tanımlanmıştır. Bu belge size yapılacak müdahaleye ait riskler, muhtemel yan etkiler, gelişebilecek sorunlar ve sonuçlar açısından sizi bilgilendirmeye yöneliktir.

Bu işlem sırasında tüm işlemlerde olduğu gibi iltihap (enfeksiyon), alerjik reaksiyonlar, ciddi kan kaybı, yara yerinde şekil bozukluğu, kol-bacak veya herhangi bir organın işlevini yitirmesi, felçler (tek bir kol bacak veya bölgede, vücudun sağ veya sol yarısında,boyundan aşağı tüm vücutta), beyin hasarı, kalp durması veya ölüm olabilir. Ayrıca anestezi, anestetik ilaç ve maddelere bağlı beyin, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek veya herhangi bir organ hasarı veya kaybı olabilir. Kürtaj hastanede yatmadan yapılabilen bir işlem olmasına rağmen, ortaya çıkacak sorunlar nedeniyle hastanede yatarak takip ve ilaçla veya cerrahi tedavi gerekebilir.

Kürtaj için kadın (jinekolojik) muayene pozisyonunda iken hazne ve rahim ağzı mikrop öldürücü sıvılarla temizlenip, gerekirse rahim ağzına ağrıyı hissetmeyi önleyen iğneler veya serum takılarak genel anestezi (uyutma işlemi) yapılır. Daha sonra rahim ağzı tutularak, buji denilen giderek kalınlığı artan metal çubuklarla genişletilir. İçeriye emme görevi gören vakum denilen metal, cam veya plastik borular sokularak gebelik kesesi, çocuk eşi ve çocuğa ait dokular büyük bir plastik enjektör veya kavanoz içerisine alınır. Gerekirse bu işlemin tamamını yapmak için veya çocuk ve ekleri vakumla alındıktan sonra rahim boşluğunun kontrolü ve kalan parçaların çıkarılması için küret denilen halka şeklinde bir tarafı kısmen keskin bir alet de kullanılabilir.

Bu işlem sırasında ağrı duyulmaması için kullanılan lokal anestetik madde nedeni ile allerjik reaksiyonlar oluşabilir. Bunun sonucu olarak sinirlilik, çarpıntı, kaşıntı, öksürük, nefes almada zorlanma, hava yollarının kasılarak daralması ve bayılmalar ile kendini gösteren bir tablonun çeşitli dereceleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum karşısında damar yolu ile çeşitli sıvı ve ilaç tedavisi yapılmak zorunda kalınabilir. İlacın direk damar içine verilmesi veya dolaşıma hızla karışması sonucu kalp kasındaki kasılma bozukluğuna bağlı olarak kalp atımlarında yavaşlama, durma bayılmalar ve şok gelişebilir. Sinir sistemindeki yan etkiler sonucu dilde uyuşma, sersemlik hali ve bayılmalar olabilir.

Kürtaj sırasında bebek veya eklerine ait parça veya parçalar kalıp ikinci kez kürtaj gerekebilir. Kürtaj işleminin kendisine veya sonrasında gelişecek sorunlara ve hastalıklara bağlı olarak rahim içi ve tüplerde oluşan yapışıklık, tıkanma veya diğer yaralanmalar sonucu adet görememe, kısırlık, cinsel işlev bozuklukları, ağrılı adet görme veya varsa bu sorunlarda şiddetlenme olabilir. Kürtaja başlandıktan sonra rahim içerisine ulaşılamayıp işlem tamamlanmadan kürtaja son verilebilir. Kürtajdan sonra pişmanlık, kendini iyi hissetmeme, ağrı, ruhsal çöküntüler (depresyon) olabilir.

Kürtaj sırasında rahim delinebilir, işlem bölgesi ve komşuluğundaki organ(bağırsak, idrar torbası, böbrek ve idrar torbası arasındaki idrar yolu,üreter gibi), damar ve sinirler yaralanabilir. Kan verilmesini gerektirebilecek ve hayatı tehdit edebilecek kanamalar olabilir. Böylece kan verilmesine bağlı olarak alerji, damar içinde kan hücrelerinin parçalanması(hemoliz), böbrek yetmezliği, bazı kanla bulaşan mikrobik hastalıkların bulaşması (hepatit B, hepatit C , HIV, CMV vb) ve ölüm olabilir. Kanamaları durdurmak amacıyla kullanılan elektrikle yakmaya (elektrokoter) bağlı olarak karın içi veya uzak organlarda (cilt, bağırsak, kol-bacak damarları vb) yanıklar, organ yaralanmaları, organ kaybı ve bunlar için ilaçla veya cerrahi tedavisi gerekebilir. Kürtaj sırasında veya hemen sonrasında toplardamar veya atardamarlarının pıhtı ile tıkanması, iltihabı sonucu herhangi bir organ (akciğer, kalp, beyin, kol, bacak vb) veya o organın işlev kaybı olabilir. Rahim ve etrafında olabilecek kanamaya bağlı pıhtı kitlesi (hematom), iltihap sonucu apse oluşabilir. Rahim içi ve etrafı, karın zarı iltihaplanabilir. Kürtaj sırasında veya sonrasında solunum sistemi ile ilgili problemler (zatürree veya akciğerlerin kısmen veya tamamen sönmesi) ve solunum yetmezliği oluşabilir. Kürtaj sırasında ve sonrasında kalp krizi, kalp durması, kalp yetmezliği ve kalp atımında düzensizlikler olabilir. Kürtajdan sonra karın zarının iltahabı veya bağırsak düğümlenmesine bağlı olarak gaz ve dışkı çıkaramayabilirsiniz ve bu nedenlerle acil işlem gerekebilir. İşlem sırasında idrar torbası, böbrek ve idrar torbası arasındaki idrar yolu(üreter) kesilebilir, bağlanabilir veya dikişler nedeniyle katlanabilir, daralabilir veya tıkanabilir.Bu sorunun düzeltilmesi ikinci bir operasyon gerekebilir. Yaralanma, iltihap, yapışıklık ve beslenme bozukluğuna bağlı olarak komşu organlar veya karın duvarı arasında istenmeyen kanalsı bağlantılar (fistül) ve buna bağlı olarak karından , vajinadan, makattan idrar veya (büyük abdest) dışkı kaçağı olabilir. Bu durumun düzeltilmesi için mesane, böbrekler veya bağırsaklar borular (kateter) yardımıyla uzun bir süre cilde açılıp boşaltılarak, ikinci bir işlemla bu organlar düzeltilebilir. İdrarın idrar torbasından dışarı boşaltılmasına yarayan boru şeklindeki organ (üretra) yaralanabilir tıkanabilir, bunun sonucu acil işlem gerektirecek şekilde hiç idrar yapamayabilirsiniz. İdrarın idrar torbasından dışarı boşaltılmasına yarayan

boru şeklindeki (üretra) organla komşu oranlar arasında (cilt , hazne, rahim) istenmeyen kanalsı bağlantılar (fistül) ve buradan sürekli idrar kaçağı olabilir ve düzeltilmesi için işlem gerekebilir. Karın, kasık ve haznede yapılan herhangi bir girişim sırasında veya sonrasında oluşan sorunun düzeltilmesi ve organların tamiri için , idrar ve/veya dışkının karından çıkarılması amacıyla böbreğin özel bir boru takılarak veya bağırsağın cilde açılarak dikilmesi (nefrostomi, kolostomi)ve bu işlem için karın duvarının kasıktan göğüse kadar kesilmesi gerekebilir. Kürtaj sırasında gerilme, kesilme, yanmaya (elektrokoter) veya uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı bacak ve kasık sinirlerinde, kalıcı ya da geçici felç-kısmi felç sonucu kalıcı veya geçici bacak hareketlerinde kısıtlılık, ağrı, uyuşma, yürüyememe veya yürüme bozukluğu olabilir.

Ben.....;yukarıdaki bilgilerin tamamını okudum. Kürtajın sonuçlarını öğrendim. Anlamadığım konuları doktora sordum. Sözlü ve gerektiğinde görüntülerle (elle çizim, şekil, fotoğraf video vb) yapılan açıklamaları ve cevapları yeterli buldum.Tıbbın tam bir pozitif bilim olmadığını ve herhangi işlemın sonucuyla ilgili, herhangi bir garanti verilemeyeceğini biliyorum. Kürtaj veya sonrasında olabilecek bir işlem sırasında gerektiğinde, beklenmeyen veya önceden görülemeyen sorunlar veya nedenlerle işlemın büyütülebileceğini veya yukarıda adı belirtilmeyen başka bir işlem yapılabileceğini kabul ediyorum. Bu bilgiler ışığında, kimsenin ısrarı olmadan aklım başımda ve bilincim yerinde, işlema onay veriyorum.

Hastanın Adı Soyadı :

TARİH:…../……./……. **İmza**

Eşinin veya Vasisinin Adı Soyadı:

TARİH:…../……./……. **İmza**

Doktor Adı Soyadı :

TARİH: …../……./…… **İmza**

Hasta formu imzalayamadıysa nedeni:.....